



イチゴ育苗試験

左:対照区 右:活根彩果500倍希釈



水稲育苗試験

左:対照区 右:活根彩果500倍希釈

効果のある作物

- 花 卉： クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、蘭、菊など
- 果菜系： トマト、スイカ、メロン、イチゴ、きゅうり、なす、ピーマンなど
- 葉菜系： ほうれんそう、キャベツ、白菜、小松菜、ブロッコリーなど
- 根菜系： だいこん、人参、ごぼう、ジャガイモ、サツマイモなど
- 茎菜系： アスパラガス、長ネギ、玉ネギ、ニンニクなど
- 豆 類： 大豆、枝豆、落花生、エンドウなど
- その他： 水稲、小麦、お茶、芝生など



使用方法

- 花き類、果菜類、水稲などあらゆる作物の育苗時に週に1回、500倍～1000倍希釈液を灌水してください。
- 定植直前、500倍～1000倍希釈液へのドブ浸けを1～2時間ほど行ってください。
- 定植直後、苗の活着促進のため、500倍～1000倍希釈液を5日おきに3度灌水してください。
- 果樹系や栽培期間中は、月に1回500倍～1000倍希釈液を灌水してください。
- 希釈倍率を勘案されない場合、目安となる量は1～2kg/10aです。

※葉面散布でもご利用いただけます。 ※農薬との混用可(強アルカリ性のものとは混用しないでください)
 ※沈殿物があるため良く振ってご使用ください。

使用上の注意

●皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。●本品の保管は、冷暗所に保管してください。●本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。お手数ですが沈殿物は除去してお使いください。●単剤での使用をおすすめします。アルカリ剤の農薬とは混用しないでください。●石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。

甘彩六花ホームページ
QRコード



【ホームページのご案内】

その他詳しい情報はホームページ
<http://www.amayorikka.jp/>を
 ご参照下さい。

アマイロリッカ

検索

【お問い合わせ】 お気軽にお電話ください!

甘彩六花株式会社
 東京都千代田区平河町 1-6-15 USビル6F
 TEL : 03-5213-4658 FAX : 03-5213-4691