

育苗期から定植期に週に1回、1kg灌水するだけ!



効果のある作物

根菜系：だいこん、人参、ジャガイモ、ごぼう、さつまいもなど

果菜系：トマト、いちご、きゅうり、なす、メロン、スイカ、ピーマン、トウモロコシなど

茎菜系：ニンニク、アスパラ、生姜、長ネギ、ザーサイなど

葉菜系：ハウレンソウ、キャベツ、ブロッコリー、白菜、小松菜、玉ねぎなど

花 卉：菊、カーネーション、クリスマスローズ、バラ、トルコギキョウ、ガーベラ、蘭など

豆 類：大豆、小豆、エンドウ、枝豆、そらまめ、落花生など

その他：水稲、芝生、小麦、お茶など

使用方法

- 花き類、果菜類、水稲などあらゆる作物の育苗時に週に1回、500倍～1000倍希釈液を灌水してください。
- 定植直前、500倍～1000倍希釈液へのドブ浸けを1～2時間ほど行ってください。
- 定植直後、苗の活着促進のため、500倍～1000倍希釈液を5日おきに3度灌水してください。
- 果樹系や栽培期間中は、月に1回500倍～1000倍希釈液を灌水してください。
- 希釈倍率を勘案されない場合、目安となる量は1～2kg/10aです。

※葉面散布でもご利用いただけます。 ※農薬との混用可(強アルカリ性のものとは混用しないでください)

※沈殿物があるため良く振ってご使用ください。

使用上の注意

●皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分に洗い流してください。●本品の保管は、冷暗所に保管してください。●本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。よく振ってご使用下さい。●単剤での使用をおすすめします。アルカリ剤の農薬とは混用しないで下さい。●石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。

甘彩六花ホームページ
QRコード



【ホームページのご案内】

その他詳しい情報はホームページ

<http://www.amairorikka.jp/>を
ご参照下さい。

アマイロリッカ

検索

【お問い合わせ】 お気軽にお電話ください!

甘彩六花株式会社

東京都千代田区平河町 1-6-15 USビル6F

TEL : 03-5213-4658 FAX : 03-5213-4691